

# CYSTICERCOSIS CE



## Western Blot IgG

Test immunoblot de diagnostic *in vitro*

Technique manuelle / semi-automatisable

*In vitro* diagnostic Immunoblot assay

Semi-automated / manual technique

#CYS-WB24G: 24 tests

#CYS-WB12G: 12 tests

#CYS-WB96G: 96 tests

## NOTICE D'UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE - page 9

Retrouvez plus d'informations et les notices traduites dans votre langue  
sur notre site internet [www.ldbiodiagnostics.com](http://www.ldbiodiagnostics.com)

Find more information and IFU in your language on our website [www.ldbiodiagnostics.com](http://www.ldbiodiagnostics.com)



## INDICATION DU TEST

**CYSTICERCOSIS Western Blot (WB) IgG** est un test qualitatif à usage unique de diagnostic sérologique IgG par immunoblot de la cysticercose proposé comme test de confirmation d'un résultat positif ou équivoque obtenu par les tests classiques de dépistage. Il peut être pratiqué sur le sérum et sur le liquide céphalo-rachidien (LCR).

## PRINCIPE DU TEST

### Technique de Western Blot

Les antigènes (extrait de cysticerques de *Taenia solium* d'origine porcine), après séparation électrophorétique, ont été fixés par électro-transfert à la surface d'une feuille de nitrocellulose (appelée le transfert) qui est ensuite découpée en 24 bandelettes identifiées de 1 à 24.

### Déroulement du test

Chaque échantillon sérique (ou LCR) à tester est incubé séparément avec une bandelette. Les anticorps spécifiques éventuellement présents dans le prélèvement se fixent sélectivement sur les antigènes. A l'étape suivante, le conjugué Phosphatase Alcaline-anti-IgG humaines se lie aux anticorps fixés. Enfin, les immun-complexes réagissent avec le substrat. Les antigènes reconnus par les anticorps spécifiques de classe IgG présents dans les échantillons sont ainsi révélés sous forme de bandes transversales violettes.

## RÉACTIFS FOURNIS

Par défaut, conditionnement 24 tests (#CYS-WB24G).

*Italique* : conditionnement 12 tests (#CYS-WB12G) – **Gras** : conditionnement 96 tests (#CYS-WB96G)

ID	Qté	Description	Composition
R1	1	Pochette(s) de 24 ( <b>12, 4x24</b> ) BANDELETTES prédécoupées + Standards colorés. (Chaque pochette et chaque transfert est identifié par un numéro de série unique)	Nitrocellulose sensibilisée. Poids Moléculaires Colorés (kDa) : Bleu : 250, bleu : 150, bleu : 100, rose : 75, bleu : 50, vert : 37, rose : 25, bleu : 20, bleu : 15, jaune : 10.
R2	1	Flacon de 30 ( <b>30, 125</b> ) mL de DILUANT ECHANTILLON (Prêt à l'emploi - solution rose).	Tampon + surfactant + NaN3 (inf. 0,1%).
R3	1	Flacon(s) de 30 ( <b>30, 2x60</b> ) mL de CONJUGUE ANTI-IgG (Prêt à l'emploi - solution bleue).	Tampon + sérum polyclonal de chèvre anti-IgG humaines conjugué à la phosphatase alcaline + NaN3 (inf. 0,1%) + stabilisants.
R5	1	Flacon de 30 ( <b>30, 125</b> ) mL de SUBSTRAT (Prêt à l'emploi - flacon opaque marron).	Tampon + NBT + BCIP + stabilisants.
R6	1	Flacon de 60 ( <b>60, 250</b> ) mL de TAMPON DE LAVAGE CONCENTRE 10X <u>(A diluer 10 fois dans de l'eau distillée - solution incolore).</u>	Tampon + surfactant.
R10	1	Tube de 200 ( <b>200, 2x200</b> ) µL de SERUM DE CONTROLE POSITIF (Prêt à l'emploi - bouchon rouge).	Tampon + pool de sérum humains positif en sérologie cysticercose + NaN3 (inf. 0,1%) + stabilisants.

**R1** : La lettre devant chaque numéro de bandelette est spécifique du paramètre.

**R2, R3, R5 et R6** sont communs à tous les kits LDBIO Diagnostics et présentent un numéro de lot unique qui ne dépend que de la date de leur production. **Il est recommandé de réaliser des séries multiparamétriques (cf.**

**gamme immunoblots LDBIO Diagnostics) pour limiter le nombre de flacons entamés et pour assurer un meilleur contrôle de qualité.**

**R10** est étalonné en immunoblot par rapport à un lot de référence et n'est destiné qu'à cette technique.

| R3, R10 (NaN3) : EUH 032 - Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande ainsi que sur notre site internet [www.ldbiodiagnostic.com](http://www.ldbiodiagnostic.com)

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI

- Une cuve d'incubation multicanaux en polypropylène adaptées aux miniblots (#WBPP-08 ou équivalent).
- Un agitateur oscillant pour immunoblots, un système d'aspiration pour les liquides (les cuves LDBIO #WBPP- 08 que nous fournissons peuvent être vidées par simple retournement).
- Tubes et matériel pour le prélèvement des échantillons, éprouvettes graduées, récipients adaptés. Pipettes automatiques, micropipettes et pointes à usage unique (volumes de 25µL, 1,2mL et 2mL).
- Eau distillée ou déionisée. Papier absorbant (ex : papier filtre Whatman), ruban adhésif transparent.
- Gants, pincette pour manipuler les bandelettes, cutter ou scalpel, règle plate transparente.

**Remarque :** Nos réactifs peuvent être utilisés sur automate pour immunoblots. **Attention aux possibles contaminations chimiques de nos réactifs si l'automate est partagé avec des réactifs d'un autre fabricant** (exemple connu : contamination par le TWEEN 20) et aux contaminations bactériologiques. Dédier des flacons à l'automate. Ne pas rempoter les réactifs en fin de manipulation.

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET PÉREMPPTION

Conservation entre 2°C et 8°C. Les réactifs du coffret sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur le couvercle de la boîte et sur les étiquettes des flacons, en l'absence de contamination. Ne pas utiliser de réactif contaminé ou trouble. Le tampon de lavage dilué 1/10 est stable pendant 2 mois à +2-8°C et pendant une semaine à température ambiante.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Sécurité

- Pour usage *in vitro* exclusivement. Pour usage professionnel uniquement. Réservé à un personnel formé à la technique. Manipuler selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire et considérer tout réactif et tout échantillon comme potentiellement毒ique et/ou infectieux.
- Porter une blouse, des gants et lunettes de protection, ne pas boire, manger ou fumer dans le laboratoire. Ne pas pipeter avec la bouche.
- Le contrôle positif est un sérum d'origine humaine qui a subi une inactivation concernant les virus HIV 1 et 2, hépatite B et hépatite C. Il doit cependant être manipulé comme un produit potentiellement infectieux.
- Le substrat contient un mélange NBT et BCIP, toxique par contact (peau et muqueuses) et inhalation.
- Les réactifs contiennent de l'azide de sodium susceptible de former des sels métalliques explosifs avec le plomb ou le cuivre. Rincer à l'eau tout rejet à l'évier.
- Éliminer les déchets (prélèvements, pointes, tubes, liquides de lavage, réactifs usagés...) conformément aux bonnes pratiques en usage dans la profession et aux règlements en vigueur dans le pays.
- Tout incident grave doit faire l'objet d'une déclaration auprès du fabricant et de l'autorité compétente.

### Précautions

- Lire et interpréter les résultats sous une lumière blanche et directe.
- Il est préférable d'utiliser tous les réactifs d'un même lot. En cas d'utilisation de lots différents, en assurer la traçabilité.
- Utiliser les bandelettes dans leur ordre numérique. Ne pas mélanger des bandelettes de plusieurs numéros de série mais utiliser les transferts successivement. Etablir un plan de distribution précis avant de commencer la manipulation.
- Ne pas toucher les bandelettes avec les doigts, utiliser une pincette.
- Les réactifs doivent être bien mélangés avant usage, en particulier le tampon de lavage concentré.
- Refermer les flacons après usage, ne pas utiliser en cas de pénétration accidentelle de substance dans les réactifs. Ne pas utiliser de réactif provenant d'un flacon présentant des signes de fuite. Ne pas utiliser de solution trouble ou précipitée.
- N'utiliser que des cônes de pipette à usage unique. Eviter toute contamination inter-puits. Attention à la formation de mousse/bulles dans les cônes de pipette (contamination bactérienne des réactifs).
- Ne jamais nettoyer les cuves d'incubation à la javel ou au détergent. Utiliser seulement de l'eau distillée ou déionisée.
- L'omission de distribution d'un échantillon ou la distribution d'un volume inapproprié peut faire considérer comme négatif ou positif le résultat du test quel que soit son statut réel.

## PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS

Prélever de manière aseptique les échantillons sur tube sec. Un minimum de 25µl de sérum ou de LCR est nécessaire. Dans le cas particulier du LCR, l'utilisation de 50 µl permettront d'augmenter la sensibilité du test.

Conserver les échantillons à 2-8°C. S'ils doivent être conservés plus d'une semaine, les congeler à -20 ± 5°C. Ne pas utiliser d'échantillon contaminé. Éviter de congeler et décongeler les échantillons plusieurs fois.

Bien qu'aucune interférence particulière n'ait été relevée avec des sérum hémolysés, ictériques ou lipidiques, il est conseillé d'interpréter les résultats provenant de l'utilisation de tels échantillons avec prudence.

## PRÉPARATION DES RÉACTIFS

**Tampon de lavage :** Pour 4 tests, diluer dans un flacon propre 10mL de tampon de lavage concentré 10x (R6) dans 90mL d'eau distillée ou déionisée. Attention à bien mélanger le tampon dilué.

## MODE OPÉRATOIRE

*Nota Bene :* Il est recommandé de réaliser des séries multiparamétriques (cf. gamme immunoblots LDBIO Diagnostics) pour limiter le nombre de flacons entamés et pour assurer un meilleur contrôle de qualité.

- Etablir le plan de distribution des échantillons et du contrôle positif C+ (**R10**).

Seule l'utilisation de ce contrôle permet de valider techniquement la manipulation et d'identifier pour un numéro de série donné, les bandes spécifiques révélées. Il n'est pas possible d'utiliser une bandelette C+ pour interpréter les résultats de bandelettes issues d'un transfert de numéro de série différent.

- Découper le nombre de bandelettes (R1) nécessaires, à l'aide d'un scalpel et d'une règle plate transparente, propre et sèche, en conservant le trait bleu de positionnement sur les bandelettes : les maintenir fermement plaquées par la règle et les découper du côté de la souche (les numéros étant visibles au travers de la règle par transparence).
- Distribuer 1,2mL de tampon échantillon (R2) dans chacun des puits selon le plan établi.
- Déposer dans leur ordre numérique les bandelettes numérotées dans les puits : laisser les bandelettes se réhydrater à la surface du tampon pendant environ 2 minutes, numéro visible vers le haut PUIS agiter doucement la cuve afin de les immerger totalement dans le tampon.
- Distribuer échantillons et contrôle(s) positif(s) : selon le plan de distribution, à raison de 25 µL par puits (de préférence 50 µL pour le LCR). Agiter doucement la cuve après chaque dépôt. La placer sur un agitateur oscillant.
  - Sérum : **Incubation 90 minutes** ± 5 minutes à 20-26 °C.
  - LCR : **Incubation pendant une nuit (16h +/- 2h)** à 20-26°C. Couvrir la cuve d'incubation avec une feuille d'aluminium pour éviter la dessiccation.
- Lavage : vider le contenu des puits à l'aide d'une pipette pasteur ou par retournement de la cuve d'incubation. Répartir 2 à 3 mL de tampon de lavage dilué dans chacun d'eux et incuber 3 min sur l'agitateur. Répéter 2 fois, puis vider le contenu des puits. Faire attention à ce que les bandelettes ne se retournent pas dans leurs puits au cours de ces opérations.
- Distribuer 1,2 mL de conjugué anti-IgG (R3) dans chacun des puits. Placer la cuve sur l'agiteur oscillant. **Incubation 60 minutes** ± 5 minutes à 20-26°C.
- Lavage : procéder comme pour l'étape 6.
- Distribuer 1,2 mL de substrat NBT/BCIP (R5) dans chacun des puits et placer sur l'agiteur oscillant, à l'abri de la lumière directe. **Incubation 60 minutes** ± 5 minutes à 20-26°C.

Quel que soit le paramètre, surveiller le développement de la coloration. La révélation peut être interrompue si la couleur du fond de la bandelette s'assombrit au point de rendre la lecture difficile (La qualité des lavages a une influence fondamentale sur cette coloration). Noter que les bandelettes s'éclairciront en séchant.

- Arrêter la réaction par aspiration du substrat avec une pipette pasteur ou par retournement de la cuve d'incubation puis par la distribution de 2mL d'eau distillée ou déionisée dans le puits. Répéter une fois ce dernier lavage.
- Séchage des bandelettes : les puits toujours remplis d'eau, saisir les bandelettes par leur extrémité numérotée à l'aide de la pince et les déposer, numéro visible, sur un papier absorbant de type Whatman. Les laisser sécher à l'air. La couleur des bandelettes s'éclaircit naturellement en séchant. La lecture ne doit s'effectuer qu'après séchage complet.
- Stockage : transférer les bandelettes sur la feuille de papier qui servira à les archiver. Aligner les traits de positionnement bleus. Pour cela, maintenir les bandelettes avec la règle plate et les coller par le haut à l'aide du ruban adhésif transparent.

Pour une bonne interprétation, les bandelettes doivent être ordonnées par transfert et dans leur ordre numérique, espacées d'au maximum quelques millimètres. Il est aléatoire de vouloir comparer des bandelettes distantes (ex : n°2 avec n°15). **Il est dangereux** (faux résultats) de vouloir comparer des bandelettes de kits différents (numéros de série de bandelettes différents).

## CONTRÔLE QUALITÉ ET INTERPRÉTATION


Le sérum de contrôle (contrôle positif R10) fourni avec le coffret doit systématiquement être inclus dans toute série d'immunoblots. Il présente le profil type permettant : (1) de valider techniquement le bon déroulement du test (les bandes doivent apparaître très nettement sur la bandelette) ; (2) et d'établir précisément la position et l'aspect des bandes spécifiques nécessaires à l'interprétation des résultats de bandelettes issues d'un même transfert (même numéro de série).

*Nota Bene* : Le profil du contrôle positif R10 peut être variable en fonction des lots de réactifs utilisés. Les images correspondantes sont disponibles sur notre site internet [www.Idbiagnostics.com](http://www.Idbiagnostics.com), à titre d'exemple.

### Description des bandes

Un échantillon positif peut présenter de nombreuses bandes situées entre 2 et 200 kilodaltons (kDa). En pratique et pour des raisons de spécificité, seule la zone de 6 à 55 kDa est retenue pour la lecture.

Dans cette zone, 5 bandes sont le plus couramment présentes aux poids moléculaires suivants **6-8, 12, 23-26, 39, 50-55 kDa**. Elles sont donc appelées : **P6-8, P12, P23-26, P39 et P50-55**.



**Fig. 1 :** Exemples de résultats positifs et négatifs

Les profils sont donnés à titre d'exemple. Les bandelettes comportent à partir du lot « 04010 » la lettre « E » spécifique du paramètre.

### Aspect des bandes

Les bandes **P6-8 et P23-26** peuvent apparaître sous la forme d'une seule bande large ou d'une double bande. La bande **P50-55** se présente classiquement sous la forme d'une large bande au contour assez flou.

**Remarques importantes - En Pratique (voir *Fig. 1*) :**

Les zones 6-26 kDa et 39-55 kDa sont les plus spécifiques, les plus facilement lisibles et interprétables.

La zone intermédiaire, délimitée par les bandes P23-26 et P39, n'est pas totalement spécifique de la cysticercose (réactions croisées fréquentes en particulier avec d'autres helminthiases et le parasite responsable du paludisme *P. falciparum*).

## Interprétation

La présence d'un minimum de **2 bandes bien définies** parmi les 5 précédemment décrites, P6-8, P12, P23-26, P39 et P50-55, est indicative d'une cysticercose dans le sérum et d'une neurocysticercose dans le LCR.

Exemples ci-dessus : « + » = neuro-cysticercose - 8, 14, 11 = hydatidose 7 = échinococcose alvéolaire.

**Remarque :** La bandelette 7 présente l'aspect non spécifique "Mikado" décrit dans la section « Problèmes rencontrés ».

*Pour la validation des résultats, toujours comparer le profil de l'immunoblot de chaque échantillon avec celui du contrôle positif R10. L'aspect des bandes est important dans l'interprétation du test.*

## LIMITES DU TEST

- Le diagnostic d'une maladie infectieuse ne peut pas être établi sur la base du résultat d'un seul test.
- Dans le but d'établir un diagnostic clinique, les résultats sérologiques doivent être interprétés en fonction des renseignements disponibles (ex : épidémiologie, clinique, imagerie, biologie...). Ils ne doivent pas faire poser le diagnostic sur leur seule positivité.

## PERFORMANCES (cf. références bibliographiques p16)

### Sensibilité (Se)

L'évaluation a porté sur 79 échantillons (70 sérum et 9 LCR) positifs selon des critères cliniques, épidémiologiques, radiologiques et/ou sérologiques.

77 échantillons dont les 9 LCR sont retrouvés positifs. **Sensibilité Se = 97,5%.**

### Spécificité (Sp)

L'évaluation a porté sur 95 échantillons incluant 81 sérum de patients atteints des infections parasitaires suivantes : *Toxocara canis* (7), *Trichinella spiralis* (14), *Toxoplasma gondii* (7), Filarioses (7), *Fasciola hepatica* (4), *Echinococcus granulosus* (14), *E. multilocularis* (14), *Schistosoma* sp. (14) et 14 sérum de patients atteints de maladies auto-immunes : Facteur rhumatoïde RF+ (7), Anticorps anti-nucléaires ANA+ (7). Tous sont retrouvés négatifs. **Spécificité Sp = 100%.**

*Nota Bene* : Certains échantillons présentent des bandes isolées, fines, qu'il ne faut pas confondre avec des bandes spécifiques (cf. *Fig.1*). En particulier, l'aspect caractéristique (large et diffus) de la bande **P50-55** permet de la différencier des bandes fines parfois retrouvées à ce niveau avec les sérum d'échinococcose, d'hydatidose ou de schistosomiases.

## Conclusion

La corrélation entre le WB cysticercose et la clinique est excellente.

**Sensibilité Se = 97,5% [IC95 90,3 – 99,6%]**

**Spécificité Sp = 100% [IC95 95,1 - 100%]**

Les intervalles de confiance sont calculés selon la méthode de Wilson avec correction de la continuité.

## Reproductibilité

Les reproductibilités inter-séries et inter-lots ont été testées. Dans les deux cas, la corrélation sérum à sérum vis-à-vis des bandes spécifiques est excellente.

## Interférences

Bien qu'aucune interférence particulière n'ait été relevée avec des sérums hémolysés, ictériques ou lipidiques, il est conseillé d'interpréter les résultats provenant de l'utilisation de tels échantillons avec prudence.

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

**"Les bandes sont pâles et peu contrastées"** : certains sérums très peu chargés en anticorps peuvent donner de tels résultats.

**"Des zones d'ombre se voient, plus ou moins colorées, légèrement diffuses"** : la bandelette n'était pas totalement immergée dans l'un des réactifs et n'a pas incubé correctement sur toute sa longueur. Des taches peuvent être également présentes à l'endroit du dépôt de l'échantillon si la cuve n'a pas été agitée après la distribution.

**"Le bruit de fond est important, rendant la lecture très difficile"** : les lavages ont été insuffisants ou la dernière incubation a été trop longue. S'assurer du bon déroulement technique du test, du respect des temps de lavage, de la qualité de l'eau. Diminuer le temps de la dernière incubation. Exceptionnellement, certains sérums peuvent réagir ainsi de façon non spécifique. Le résultat de l'immunoblot ne peut alors être rendu.

Ce bruit de fond non spécifique peut ne concerner qu'une partie de la bandelette, rendant les résultats ininterprétables sur cette partie seulement.

**"Un précipité apparaît dans la solution lors de la dernière étape de révélation"** : le substrat peut partiellement précipiter (flocons noirs) dans le tampon en fin de révélation. Ce phénomène n'altère en rien la qualité de la révélation qui doit être poursuivie normalement. Le lavage final à l'eau distillée élimine les particules solides éventuellement présentes.

## BIBLIOGRAPHIE : voir page 16

### NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE VERSION – A lire attentivement

DATE DE VERSION	VERSION	RÉSUMÉ DE LA MODIFICATION
06/08/2021	Vs 19	Suppression de l'avertissements sécurité R5 – Durée incubation nocturne - Adresse mail de contact – NaN3 EUH 032
30/11/2022	Vs20	Nouvelle adresse
05/04/2023	Vs21	R6 sans NaN3. Bandelette identifiée par lettre. Possibilité d'utilisation de réactifs de lots différents.

# CYSTICERCOSIS Western Blot IgG



## INTENDED USE

**CYSTICERCOSIS Western Blot (WB) IgG** is a single use qualitative test of serological IgG diagnosis by Immunoblot Assay of cysticercosis intended for confirmatory testing of a positive or equivocal result obtained through classic screening tests. It can be performed on sera or cerebrospinal fluid (CSF).

## PRINCIPLE OF THE TEST

### Western Blot technique

The antigens (*Taenia solium* cysticerci extract of porcine origin), once separated by electrophoresis, are bound by electroblotting to the surface of a nitrocellulose membrane (called the transfer) cut into 24 strips numbered from 1 to 24.

### Conduct of the test

Each specimen to be tested is separately incubated with a strip. The specific antibodies potentially present in the sample selectively bind themselves onto the antigens. The alkaline phosphatase-anti human IgG conjugate then binds itself to the bound antibodies. Finally, the immunocomplexes react with the substrate. The antigens recognized by the specific antibodies of type IgG present in the samples are revealed as purple transversal bands.

## REAGENTS SUPPLIED

**Default:** package of 24 tests (#CYS-WB24G).

*Italic:* package of 12 tests (#CYS-WB12G) – **Bold:** package of **96 tests** (#CYS-WB96G)

ID	Qty	Description	Composition
R1	1	Folder(s) of 24 (12, <b>4x24</b> ) STRIPS: precut + coloured Standards. (Each folder and each transfer is identified by a unique serial number)	Sensitized nitrocellulose. Coloured Molecular Weight (kDa): Blue: 250, Blue: 150, Blue: 100, Pink: 75, Blue: 50, Green: 37, Pink: 25, Blue: 20, Blue: 15, Yellow: 10.
R2	1	Vial of 30 ( <b>30, 125</b> ) mL of SAMPLE BUFFER (Ready to use - pink solution).	Buffer + surfactant + NaN3 (<0.1%).
R3	1	Vial(s) of 30 ( <b>30, 2x60</b> ) mL of ANTI IgG CONJUGATE (Ready to use - blue solution).	Buffer + anti-human IgG polyclonal goat sera conjugated with Alkaline Phosphatase + NaN3 (<0.1%) + stabilisers.
R5	1	Vial of 30 ( <b>30, 125</b> ) mL of SUBSTRATE (Ready to use - opaque brown vial).	Buffer + NBT + BCIP + stabilisers.
R6	1	Vial of 60 ( <b>60, 250</b> ) mL of WASH CONCENTRATE 10X BUFFER <u>(To be diluted 10 times in distilled water - colourless solution).</u>	Buffer + surfactant.
R10	1	Tube of 200 ( <b>200, 2x200</b> ) µL of POSITIVE CONTROL SERUM (Ready to use - red cap).	Buffer + pool of human sera positive in cysticercosis serology + NaN3 (<0.1%) + stabilisers.

| R1: The letter before each strip number is specific to the parameter.

**R2, R3, R5 and R6** are common to all kits and have a unique lot number depending only on the date of their production. It is recommended to perform multiparameter testing (see the LDBIO immunoblot range) to limit the number of vials opened and to ensure better quality control.

**R10** is calibrated in immunoblot according to a reference lot and is only dedicated to this technique.

| R3, R10 (NaN3): EUH 032 - Contact with acids liberates very toxic gas.

EUH 210 Safety data sheet available on request as well as on our website [www.ldbiodiagnostics.com](http://www.ldbiodiagnostics.com)

#### ADDITIONAL MATERIAL REQUIRED BUT NOT PROVIDED

- One multi-channel polypropylene incubation trays for mini-blots (# WBPP- 08 or equivalent).
- One rocking platform for immunoblots, one vacuum system for liquids (the #WBPP-08 tubs that we supply can be emptied by simply turning them over).
- Tubes and material for drawing the samples, graduated cylinders, adapted containers. Automatic pipettes, micropipettes and disposable tips (volumes of 25 µL, 1.2 mL and 2 mL).
- Distilled or deionised water. Absorbent paper (e.g., Whatman filter paper), transparent adhesive tape.
- Gloves, tweezers to handle the strips, cutter or scalpel, flat transparent ruler.

Note: Our reagents can be used in an automated immunoblot processor. Care should be taken with possible chemical contaminations of our reagents if the processor is shared with reagents from another manufacturer (known example: contamination by the TWEEN 20), and bacterial contaminations. Reserve vials for the processor. After processing, do not place the remaining used reagents back into the original vials.

#### STORAGE AND STABILITY

Store between 2 and 8°C. The reagents from the kit are stable until the expiry date indicated on the outer box and the vial labels. Do not use contaminated or cloudy reagent. Wash buffer diluted to 1/10 is stable for 2 months at +2 to +8 °C and one week at room temperature.

## PRECAUTIONS FOR USE

### Safety

- For *in vitro* use only. For professional use only. Only for technically trained personnel. Handle according to Good Laboratory Practices and consider any reagent and any sample as potentially toxic and/or infectious.
- Wear a lab coat, gloves and glasses; do not drink, eat or smoke in the laboratory. Do not mouth the pipettes.
- The positive control is a serum of human origin that has been inactivated for HIV 1 and 2, hepatitis B and hepatitis C viruses. However, it must be handled like a potentially infectious product.
- The substrate contains a mixture of NBT and BCIP, toxic on contact (skin and mucous membranes) and inhalation.
- The reagents contain sodium azide which can form explosive metallic salts with lead and copper. Rinse any spill with water.
- Dispose of waste (samples, tips, tubes, wash liquid, used reagent...) according to good practices used in the industry and current regulations in the country.
- Any serious incident must be the subject of a declaration to the manufacturer and the competent authority.

### Precautions

- Read and interpret the results under direct white light.
- It is preferable to use all reagents from the same batch. If different batches are used, ensure traceability.
- Use the strips in numerical order. Do not mix strips from different serial numbers; use the transfers in succession. Establish a specific distribution plan before starting the test.
- Do not touch the strips with your fingers; use tweezers.
- The reagents must be mixed well before use, particularly the concentrated wash buffer.
- Close the vials after use; do not use if a substance was accidentally introduced in the reagents. Do not use reagent from a vial that presents signs of leakage. Do not use cloudy or precipitated solution.
- Use only disposable pipette tips. Avoid any inter-channel contamination. Watch for the formation of foam or bubbles in the pipette tips (bacterial contamination of reagent vials).
- Clean incubation trays only with distilled water (never use detergent or bleach).
- The omission of a sample or the distribution of an inadequate volume may render the test result negative or positive, regardless of its actual status.

## SPECIMEN COLLECTION

Aseptically collect the samples in dry tubes. A minimum of 25 µL of serum or CSF are required. In cases of CSF, using 50 µL will increase the sensitivity of the test.

Keep the samples at 2-8 °C until they are processed. If they need to be stored more than a week, freeze the samples at -20 ± 5 °C. Do not use a contaminated sample. Avoid freezing and thawing the samples repeatedly.

Even though no particular cross-reaction has been observed with haemolysed, icteric or lipidic sera, it is recommended to interpret the results from the use of such samples with care.

## PREPARATION OF REAGENTS

**Wash buffer:** For 4 tests, in a clean bottle, dilute 10 mL of Wash Concentrate 10X (**R6**) in 90 mL of distilled or deionised water. Be careful to mix the diluted buffer well.

## TEST PROCEDURE

*Nota Bene:* It is recommended to perform multiparameter testing (see the LDBIO immunoblot range) to limit the number of vials opened and to ensure better quality control.

1. Prepare a distribution plan for the samples and C+ positive control (**R10**).

Only by using this control can the test be technically validated and identification made, for a given serial number, of the specific bands developed. A C+ strip cannot be used to interpret the results of strips from a blot of a different serial number.

2. Cut the required number of strips (R1) using a scalpel and a clean and dry flat transparent ruler, keeping the blue positioning line on the strips: hold the strips firmly in place with the ruler and cut them on the side of the strain (the numbers are visible through the ruler).
3. Distribute 1.2 mL of sample buffer (R2) in each channel according to the established plan.
4. Deposit, in their numerical order, the numbered strips in the channels: Let the strips rehydrate themselves at the surface of the buffer for approximately 2 minutes, with the number visible at the top, THEN gently shake the tray to totally immerse them in the buffer.
5. Distribute the samples and positive control(s): according to the distribution plan, at a rate of 25 µL per channel (preferably 50 µL for CSF). Gently shake the tray after each dispense. Place the tray on a rocking platform.
  - Serum: **Incubate for 90 minutes ± 5 minutes at 20-26 °C.**
  - CSF: **incubate overnight (16h +/- 2h)** at 20-26 °C. You must cover the incubation tray with an aluminum foil to avoid the desiccation.
6. Wash step: Empty the contents of the channels with a Pasteur pipette or by turning the incubation tray over. Dispense 2 to 3 mL of diluted Wash Buffer in each channel. Incubate on the rocking platform for 3 min. Repeat 2 times, then empty the contents of the channels. Ensure that the strips don't turn during these steps.
7. Dispense 1.2 mL of anti IgG conjugate (R3) into each channel. Place the tray on the rocking platform. **Incubate for 60 minutes ± 5 minutes at 20-26 °C.**
8. Wash step: repeat step 6.
9. Distribute 1.2 mL of NBT/BCIP substrate (R5) into each of the channels. Place on the rocking platform and protect from direct light. **Incubate for 60 minutes ± 5 minutes at 20-26 °C.**

Regardless of the parameter, monitor the development of the colour. The development can be stopped if the background colour of the strip darkens to the point where reading is difficult (the quality of the wash steps has a fundamental influence on the background coloration). Note that the strips will lighten as they dry.

10. Stop the reaction by aspirating substrate with a Pasteur pipette or by turning the incubation tub over and dispensing 2 mL of deionised water in the channels. Repeat this last washing step one more time.
11. Drying the strips: With the channels still water-filled, take the strips by the numbered end using the tweezers and deposit them, with the number visible, onto a Whatman absorbent paper. Let air dry. The colour of the strips will naturally lighten while drying. Interpretation must only be performed after drying is complete.
12. Storage: Transfer the strips onto a sheet of paper, which will be used to archive them. Align the positioning lines. Keeping them in place with the flat ruler, stick the top of the strips with transparent adhesive tape.

For a good interpretation, the strips must be ordered by transfer and in their numerical order, spaced at a maximum of a few millimetres apart. It is unreliable to compare strips that are spaced far apart (e.g., no.2 with no.15). **It is dangerous (false results)** to compare strips from different kits (strips with different serial numbers).

## QUALITY CONTROL AND INTERPRETATION


The serum control (R10) provided with the kit must be systematically included in any immunoblot series. It shows the typical profile and allows for technical validation of the good conduct of the test (the bands must appear very clearly on the strip) and to calibrate precisely the position and aspect of the specific bands to allow interpretation of the results of the strips from the same transfer (same serial number).

*Nota Bene:* The positive control (R10) profile may vary according to the lot number of the reagents used. Corresponding images are available on our website [www.Idbiagnostics.com](http://www.Idbiagnostics.com), as an example.

### Description of the bands

A positive sample can present numerous bands located between 2 and 200 kilodaltons (kDa). In practice and for specificity reasons, only the 6 to 55 kDa range is selected for the reading.

In this area, 5 bands are most often present at the following molecular weights (kDa): **6-8, 12, 23-26, 39, 50-55**. They are therefore called: **P6-8, P12, P23-26, P39 and P50-55**



**Fig. 1:** Examples of positive and negative results

The profiles are given as examples. The strips are marked with the letter "E" specific to the parameter from batch "04010".

### Aspect of the bands

The **P6-8 and P23-26** bands can appear in the form of a large single band or a double band. The **P50-55** band traditionally presents itself in the form of a wide band with fairly fuzzy contours.

#### Important points - In Practice (see Fig. 1):

The 6-26 kDa and 39-55 kDa areas are the most specific and the most easily readable and interpretable.

The intermediate area, delimited by the P23-26 and P39 bands, is not entirely specific to cysticercosis (frequent cross-reactions, particularly with other helminthiases and *P. falciparum* malaria).

## Interpretation

The presence of a minimum of **2 well-defined bands** among the 5 previously described bands, P6-8, P12, P23-26, P39, and P50-55, is indicative of cysticercosis in the serum and of neuro-cysticercosis in the CSF.

Above examples: “+” = neuro-cysticercosis - 8, 14, 11 = hydatidosis 7 = alveolar echinococcosis.

**Note:** Strip 7 presents the non-specific “Mikado” aspect (cf. § Trouble shooting)

*To validate the results, always compare the profile of the immunoblot of each sample with that of the R10 positive control. The aspect of the bands is important when interpreting the test.*

## LIMITATION OF USE

- The diagnosis of an infectious disease cannot be established on the basis of a single test result.
- Serological results must be interpreted according to available information (e.g., epidemiology, clinical, imaging, biology...) in order to establish a diagnosis. They should not be used to make a diagnosis based on their positivity alone.

## PERFORMANCES

### Sensitivity (Se)

The evaluation covered 79 samples (70 sera and 9 CSFs) that were positive according to clinical, epidemiological, radiological and/or serological criteria.

77 samples, including 9 CSFs, were found to be positive. **Sensitivity Se = 97.5%**

### Specificity (Sp)

The evaluation covered 95 samples, including 81 sera from patients suffering from the following parasitic infections: *Toxocara canis* (7), *Trichinella spiralis* (14), *Toxoplasma gondii* (7), filariasis (7), *Fasciola hepatica* (4), *Echinococcus granulosus* (14), *E. multilocularis* (14), *Schistosoma* sp. (14) and 14 sera from patients suffering from autoimmune diseases: RF+ rheumatoid factor (7) and ANA+ anti-nuclear antibodies (7). All were found to be negative. **Specificity Sp = 100%**

**Note:** certain samples present isolated, narrow bands that should not be confused with specific bands (cf. **Fig. 1**). In particular, the characteristic aspect (large and diffuse) of the **P50-55** band differentiates the narrow bands that are sometimes found at that level from echinococcosis, hydatidosis or schistosomiasis sera.

### Conclusion

The correlation between WB cysticercosis and clinical status is excellent.

**Sensitivity Se = 97.5% [IC95: 90.3 - 99.6%]**

**Specificity Sp = 100% [IC95: 95.1 - 100%]**

Confidence intervals are calculated according to Wilson's method with continuity correction.

### Reproducibility

Inter-series and inter-lot reproducibility were tested. In both cases, the serum to serum correlation with respect to specific bands is excellent.

### Interferences

Even though no particular cross-reaction has been observed with haemolysed, icteric or lipidic sera, it is recommended to interpret the results from the use of such samples with care.

## TROUBLESHOOTING

**"The bands are pale with little contrast"**: Certain sera with low concentrations of antibodies may give such results.

**"Shaded areas can be seen, more or less coloured, slightly diffuse"**: The strip was not totally submerged in one of the reagents and did not incubate correctly along its entire length. Stains can also be present where the sample was deposited if the tray was not shaken after dispensing.

**"The background noise is significant, making reading very difficult"**: The washes were insufficient or the last incubation was too long. Ensure good test performance techniques, respect wash times and ensure water quality. Reduce the time of the last incubation. Exceptionally, certain sera may react in a non-specific manner. Then, the result of the immunoblot cannot be used.

This non-specific background noise may involve only part of the strip, making the results uninterpretable for that part only.

**"A precipitate appears in the solution during the last step of development"**: the substrate may in fact partially precipitate (black flakes) in the buffer at the end of development. This phenomenon does not alter the quality of the development which must be continued normally. The last wash with distilled water eliminates the possible solid particles present.

## BIBLIOGRAPHIE/BIBLIOGRAPHY

- Deckers N, et Dorny P. 2010. « Immunodiagnosis of Taenia Solium Taeniosis/cysticercosis ». *Trends in Parasitology* 26 (3): 137-44. doi:10.1016/j.pt.2009.12.008.
- Del Brutto OH. 2012. « Diagnostic Criteria for Neurocysticercosis, Revisited ». *Pathogens and Global Health* 106 (5): 299-304. doi:10.1179/2047773212Y.0000000025.
- Dournon N, Epelboin L, Brion MC, Paris L, Bricaire F, et Caumes E. 2012. « Seroconversion of Neurocysticercosis Occurring After Anti-Helminthic Treatment: Neurocysticercosis With Seroconversion ». *Journal of Travel Medicine* 19 (6): 383-86. doi:10.1111/j.1708-8305.2012.00658.x.
- Garcia HH, Nash TE, et Del Brutto OH. 2014. « Clinical Symptoms, Diagnosis, and Treatment of Neurocysticercosis ». *The Lancet Neurology* 13 (12): 1202-15. doi:10.1016/S1474-4422(14)70094-8.
- Gekeler F, Eichenlaub S, Mendoza EG, Sotelo J, Hoelscher M, et Löscher T. 2002. « Sensitivity and specificity of ELISA and immunoblot for diagnosing neurocysticercosis ». *European journal of clinical microbiology & infectious diseases: official publication of the European Society of Clinical Microbiology* 21 (3): 227-29. doi:10.1007/s10096-002-0695-3.
- Michelet L, Fleury A, Sciutto E, Kendjo E, Fragoso G, Paris L, et Bouteille B. 2011. « Human neurocysticercosis: comparison of different diagnostic tests using cerebrospinal fluid ». *Journal of clinical microbiology* 49 (1): 195-200. doi:10.1128/JCM.01554-10.
- Raccourt CP, Agnamey P, Boncy J, Henrys JH, et Totet A. 2009. « Seroprevalence of human Taenia solium cysticercosis in Haiti ». *Journal of helminthology* 83 (2): 113-16. doi:10.1017/S0022149X09232330.
- Rodriguez S, Wilkins P, et Dorny P. 2012. « Immunological and Molecular Diagnosis of Cysticercosis ». *Pathogens and Global Health* 106 (5): 286-98. doi:10.1179/2047773212Y.0000000048.
- Barbara S, Beović B, Lužnik Z, Skvarč M, et Logar J. 2014. « Evidence of Human Neurocysticercosis in Slovenia ». *Parasitology* 141 (04): 547-53. doi:10.1017/S0031182013001947.
- Van Doorn RH, Wentink-Bonnema E, Rentenaar RJ, et Van Gool T. 2007. « Specific Cross-Reactivity in Sera from Cystic Echinococcosis Patients in an Enzyme-Linked Immunoassay Blot for Cysticercosis Diagnostics ». *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* 101 (9): 948-50. doi:10.1016/j.trstmh.2007.04.021.

### UPDATE NOTIFICATION – Please read carefully

RELEASE DATE	VERSION	MODIFICATION SUMMARY
06/08/2021	Vs 19	Removal of security warning R5 - Night time incubation - Contact email address – NaN3 EUH 032
30/11/2022	Vs20	New address
05/04/2023	Vs21	R6 without NaN3. Strip identified by letter. Possible use of reagents from different batches.



24 Av. Joannes MASSET – 69009 LYON – FRANCE  
 Tel : +33(0)4 7883 3487 – Fax : +33(0)4 7883 3430  
[www.ldbiadiagnostics.com](http://www.ldbiadiagnostics.com) – info@ldbiadiag.com